



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA Cedex  
Tél 61.24.06 51

PUBLICATION PÉRIODIQUE  
Abonnement annuel 115 F  
Sous-régisseur Recettes D D A Hte-Gne  
CCP 8612-11 R Toulouse

I.S.S.N. : 0752-2053

BULLETIN N° 4 DU 21 AVRIL 1986

## COLZA

**Stade** E (boutons écartés) à F1 (premières fleurs ouvertes).

### MELIGETHES - CHARANCONS DE LA TIGE

**Situation** Piégeage très important.

**Préconisations** Il est inutile d'intervenir contre le Charançon de la tige, le stade de sensibilité de la culture étant dépassé.

Contre les Mèligèthes, il est encore possible d'intervenir dans les cultures n'ayant pas atteint la floraison.

**Toute intervention devient inutile à compter du stade F1.**

### CHARANCONS DES SILIQUES

**Situation** Piégeage faible, généralisé à l'ensemble des zones de production.

**Préconisations** Le seuil d'intervention est d'un Charançon en moyenne par plante (après comptage de 50 plantes).

**Surveiller les parcelles et intervenir, si le seuil est dépassé, en utilisant un des produits cités dans la Note "Ravageurs du colza" expédiée à l'automne 1985 ( bromophos, cyperméthrine, deltaméthrine, dialiphos, endosulfan, fenvalérate, phosalone).**

**Les colzas doivent être protégés contre le Charançon des siliques jusqu'au stade G4 (premières siliques bosselées).**

7.1.33

## ORGE

**Stade végétatif** 6 (1er noeud) à 7 (2ème noeud).

**Situation** Présence assez régulière de Rhynchosporiose et de Rouille naine à un degré moindre.  
Présence d'Oïdium dans quelques parcelles.

**Préconisation** *Dans les parcelles n'ayant pas encore fait l'objet de traitement, intervenir dès que possible, en utilisant :*

- soit l'une des spécialités commerciales citées dans notre bulletin n° 3 du 8 avril (en cas de présence de maladies du pied) ;
- soit l'une des spécialités commerciales de la liste ci-dessous (en cas d'absence de maladies du pied) :

Matières actives	Spécialités commerciales	Dose spécialité /ha
- triadiménol + anilazine	BAYFIDAN D	0,5 + 4 l
- fenpropimorphe + chlorothalonil	CORBEL STAR	3 l
- flutriafol + captafol	IMPACT T SOPRA	2,6 l
- dichlobutrazol + captafol	VIGIL T	2,5 l

## BLE TENDRE

**Stade végétatif** 6 (1er noeud) le plus souvent.  
7 (2ème noeud) pour certaines variétés (CASTAN, PRINQUAL).

**Situation** •Présence généralisée de maladies du pied.  
Fusariose très fréquente ; les attaques restent superficielles.  
Piétin-verse et Rhizoctone plus rares avec des attaques ne dépassant pas, pour l'ensemble de ces deux maladies, 10 % de tiges attaquées.  
•Présence faible de maladies des feuilles - Septoriose, principalement, rarement Oïdium - mais limitée aux feuilles de la base.

**Préconisation** *Tout traitement fongicide est prématuré. Attendre un prochain bulletin pour intervenir.*

## BLE DUR

**Stade végétatif** 5 (redressement) à 6 (1er noeud).

**Situation** Présence de maladies du pied et Septoriose à des niveaux encore très faibles. Observation des toutes premières pustules de Rouille brune.

**Préconisation** *Tout traitement fongicide est prématuré. Attendre un prochain bulletin pour intervenir.*

\*

\*

\*

\*